NOTE XXII.

DESCRIPTION DE DEUX ESPÈCES NOUVELLES DE HISTÉRIDES ET D'ANTHICIDES DE SUMATRA

PAR

S. de MARSEUL.

Histeridae.

1. *Platysoma Hageni*, nov. spec.

Long. 4 m.m., larg. 2,5 m.m. — Subelliptique, un peu atténué postérieurement, subdéprimé, noir de poix luisant, antennes et pattes brun-ferrugineux. — Tête lisse, entourée d'une strie bien marquée, droite derrière l'épistome qui est légèrement concave, sinuée de chaque côté à l'angle oculaire. — Prothorax droit à la base, profondément échancré au bord antérieur avec les angles saillants, côtés presque obliques et rapprochés en avant; strie marginale fine, entière, sans coude postoculaire, un peu interrompue au milieu, la latérale assez écartée de celle-ci, moins en avant et en arrière, la rejoignant au niveau de l'œil. — Ecusson en angle très aigu. — Elytres aussi larges que le prothorax, tronquées à l'extrémité; stries dorsales fortes, droites, parallèles, 1—3 entières, 4—5 raccourcies au milieu; épipleures bicarénées. — Propygidium et pygidium marqués à la base de quelques points ocellés épars, celui-ci finement chagriné. — Mentonnière large, rebordée, dépassant les angles du prothorax; prosternum assez large, sans rebords, largement arrondi à la base; mésosternum échancré en arc peu profond, strie marginale interrompue. — Jambes antérieures 4-dentées, postérieures 4-épineuses.

Strié à peu près comme dans *cribropygum* sur les élytres,

la strie latérale du pronotum est plus écartée et moins forte, la ponctuation du pygidium est toute différente; la strie mésosternale est largement interrompue.

Deux exemplaires de Tandjong Morawa dans le district Serdang: Sumatra orient. (Dr. B. Hagen).

2. *Phelister glaucus*, nov. spec.

Long. 2 m.m., larg. 1,5 m.m. — Elliptique, déprimé, vert bleu métallique, luisant, bouche, antennes et pattes ferrugineuses. — Antennes courtes, scape tordu, massue large. — Tête transverse, légèrement concave sur le front, peu ponctuée, strie rapprochée du bord antérieur, largement arquée, ne se rejoignant pas par derrière. — Prothorax transverse, bord basal obtusément anguleux, sommet échancré en arc, angles abaissés, obtus, creusés, côtés arqués en dedans vers le tiers antérieur; strie marginale fine, non interrompue, pourtour largement ponctué. — Ecusson très petit. — Elytres de la largeur du prothorax, un peu atténuées par derrière, extrémité tronquée, un peu oblique en dedans, ponctuée; stries fines, pointillées, suturale raccourcie ou obsolète en avant, 1—5 dorsales entières, ainsi que la subhumérale interne; épipleures bisillonnées. — Pygidium vaguement pointillé, ainsi que le propygidium. — Prosternum large, entouré d'une strie même à sa base qui est droite; mentonnière large et courte, rebordée; mésosternum largement échancré, traversé par une large strie peu arquée, avec une courte strie dans chaque angle. — Jambes antérieures étroites, 4-épineuses.

Ressemble beaucoup au *venustulus*, mais la tête est moins creusée, à points plus fins et plus nombreux, la strie frontale est plus rapprochée du bord antérieur de l'épistome, les stries des élytres sont plus fines, la subhumérale interne est entière, le prosternum est plus large et sa strie marginale non interrompue à la base.

Un seul exemplaire de Tandjong Morawa dans le district Serdang: Sumatra orient. (Dr. B. Hagen).

Anthicidae.

1. *Formicomus Serdangus*, nov. spec.

Long. 4 m.m., larg. 1,5 m.m. — Allongé, convexe, noir bleu, très lisse, luisant, hérissé de rares poils longs. — Antennes longues, dépassant les $^2/_3$, menues, un peu plus épaisses en dehors, garnies de poils, articles allongés, un peu renflés au bout, le 2me plus court que les suivants, le dernier acuminé. — Tête ovale, obscurément ponctuée en devant, yeux ovales, assez grands, peu saillants, sommet atténué en pointe, puis étranglé en col; dernier article des palpes maxillaires cultriforme, grand. — Prothorax long, lagéni-forme, étroit au sommet, globuleux élargi au tiers, puis profondément creusé de chaque côté, base tronquée. — Elytres deux fois plus longues, abaissées, de la largeur du prothorax à la base, élargies et ascendantes, épaules saillantes, anguleuses, côtés obliques en dehors, fortement dilatées en courbe aux $^2/_3$, convexes, rétrécies et abaissées postérieurement, arrondies à l'extrémité, débordées par le pygidium, bordées étroitement, surface lisse, longées de lignes de points écartés, très faibles, à peine perceptibles. — Pattes très longues, cuisses très minces, brusquement renflées en massue. ♂ cuisses antérieures munies au milieu interne d'un fort empâtement dentiforme, brusquement armé d'une dent mince acérée, jambes correspondantes munies aux $^2/_3$ du bord interne d'une dent obtuse ou tubercule; métasternum surmonté de deux reliefs oblongs; extrémité de l'abdomen excavée.

Diffère du *praeses* par sa taille plus grande, sa couleur noir bleu plus foncée, ses antennes et ses pattes non brun rougeâtre à la base, sa tête acuminée en cône au sommet et ses élytres plus fortement élargies aux $^2/_3$; — du *judex* par ses pattes et ses élytres plus longues, son sommet occipital plus long et plus conique.

Deux mâles de Tandjong Morawa dans le district Serdang: Sumatra orient. (Dr. B. Hagen).

2. *Anthicus hirtisetosus*, nov. spec.

Long. 3,5 m.m., larg. 1,2 m.m. — Oblong, peu convexe, noir brun luisant, garni de poils longs mi-dressés, antennes, bouche et pattes d'un pâle testacé, orné de deux taches rousses sur chaque élytre. — Antennes menues, dépassant le milieu, subfiliformes, articles longs, le 2me un peu moins, poilus, le dernier acuminé. — Tête arrondie, assez convexe, tronquée postérieurement, yeux ronds et grands, dépassés par les joues, points épars; dernier article des palpes court, cultriforme. — Prothorax oblong, plus étroit que la tête, convexe, arrondi en devant, muni d'un étroit goulot, faiblement sinué sur les côtés, presque droit à la base; couvert de points forts, écartés. — Ecusson petit, à pointe tronquée. — Elytres élargies, presque droites à la base, avec les épaules obtuses, marquées, bossettes nulles, côtés peu arqués vers le tiers postérieur, arrondies et abaissées vers l'extrémité, suture bordée de chaque côté d'une strie bien marquée, complète, un peu rapprochée derrière l'écusson et enfoncée; surface couverte de gros points peu serrés; les deux fascies rouges bien marquées, l'antérieure au premier tiers transverse, n'atteignant ni le bord externe ni le sutural, la postérieure au dernier tiers formant un angle sutural. — Pattes longues, grêles, jaune pâle, la moitié basale des jambes légèrement rembrunie.

Se rapproche de l'*hirsutus*, mais celui-ci est plus petit, avec le prothorax et la base des élytres entièrement roux-jaunâtre, les cuisses sont brunes, les élytres très densément, presque rugueusement ponctuées, et dépourvues de stries suturales.

Quatre exemplaires de Tandjong Morawa dans le district Serdang: Sumatra orient. (Dr. B. Hagen).

Paris, Avril 1884.